

для правильного воздействия на энергетику организма. Практическое обоснование способствует более быстрому запоминанию названий и функций мышц.

Учитывая время максимальной и минимальной активности органа или системы (например, для желудка период максимальной активности с 7 до 9 часов, для почек – с 17 до 19ч), можно сделать упражнения для соответствующей мышцы именно в этот период с целью усилить или ослабить энергетический потенциал данного канала. Это

оптимальное время воздействия на меридиан (и орган). Общей же рекомендацией является ежедневное проведение всего комплекса упражнений благодаря его простоте и доступности.

Впоследствии, изучая иннервацию и кровоснабжение данных мышц, студент ориентируется, каковы могут быть последствия повреждения определенных нервов и сосудов для мышцы, а, значит, и для меридиана; следовательно, на какой внутренний орган или систему стоит обратить внимание.

ПОЯСНИЧНОЕ ЛИМФАТИЧЕСКОЕ РУСЛО У МЛЕКОПИТАЮЩИХ

В. М. Петренко, Н. С. Киреева, О. В. Пиминова

Санкт-Петербургская медицинская академия имени И. И. Мечникова

У человека 11-41 поясничный лимфузел 7 и более групп, соединяющие их лимфатические сосуды образуют сплетения вокруг брюшной аорты и нижней полой вены. Из сплетений, от узлов берут начало 2-3 и более поясничных стволов. Они соединяются путем прямого слияния (14%), с образованием сплетения (20%) и цистерны, в том числе поясничного ствола (12%). Сплетение поясничных стволов обнаружено у 2/3 людей, в сочетании с цистерной – у 52%. Непостоянный кишечный ствол (1/3 людей) служит притоком поясничного ствола. Цистерна грудного протока находится большей частью в грудной полости, поясничного ствола – в брюшной полости. У крыс 3-11 поясничных лимфузлов располагаются компактными группами около бифуркации брюшной аорты и почечных ножек. Их соединяют межузловые поясничные стволы, правый и левый, а также средний (21%). Истинные поясничные стволы берут начало от краиальных поясничных, реже – каудальных поясничных и подвздошных лимфузлов или межузловых поясничных стволов. Правый и левый поясничные стволы соединяются в постоянную цистерну грудного

протока. Она целиком или большей частью находится в брюшной полости. У 2/3 почти постоянный кишечный ствол впадает в цистерну грудного протока, часто принимает участие в формировании левого поясничного ствола. Он чаще огибает аорту спереди, у человека – сзади. Цистерна поясничных стволов у крыс обнаруживается редко. Истинные поясничные стволы формируют сплетение у 15% крыс, в 4,5 раза реже, чем у человека. Поясничное лимфатическое русло у 23,7% крыс имеет строение магистрального типа (у человека не встречается), содержит магистрали у 76,3% крыс (у 20% людей). Сплетениевидный тип строения поясничного русла обнаружен у 5,3% крыс и 2/3 людей, сплетения в его составе – у 17% крыс и 100% людей. Таким образом, увеличение числа поясничных лимфузлов, их групп и площади, уровня размещения как у человека, так и в эволюции млекопитающих сопровождается демагистриализацией и усложнением строения поясничного лимфатического русла. Одновременно увеличивается уровень формирования и упрощается строение начального отдела грудного протока.